

Aandoening	Medicijn	Dosering	Duur in dgn	Hoe/waar	Wachttijd vlees
Baarmoederontsteking	Engemycine	4 ml / 50 kg.lg	max 5 dgn	in de spier	27 dgn
Gewrichtsontsteking	Peniyet	1 ml / 10 kg.lg	3-5 dgn	in de spier	9 dgn
	Engemycine	4 ml / 50 kg.lg	max 5 dgn	in de spier	27 dgn
Hersenvliesontsteking (Listeria)	Peniyet	1 ml / 5 kg.lg !!	3-5 dgn	in de spier	9 dgn
Huidontsteking (navel) of wonden	Peniyet	1 ml / 10 kg.lg	3-5 dgn	in de spier	9 dgn
	CTC-spray	1-2 x daags op de wond aanbrengen			1 dgn
Longontsteking (zomerlongontst.)	Engemycine	4 ml / 50kg.lg	3-5 dgn	in de spier	27 dgn
	Peniyet	1 ml / 10 kg.lg	3-5 dgn	in de spier	9 dgn
Ooglidontsteking (conjunctivitis)	Opticlox	1/6 injector	4 x daags	op de oogbol	1 dgn
Strottenhoofdontsteking	Peniyet	1 ml / 10 kg.lg	3-5 dgn	in de spier	9 dgn
Uierontsteking (mastitis)	Orbenin lactation	1 inj per speen/48u	3-malig	in de uier	11 dgn
	Mamyzin	5 ml van de oplossing/dag	3 dgn	in de spier	15 dgn
Verwerpen	Engemycine	4 ml / 50 kg.lg	max 5 dgn	in de spier	27 dgn
Pijnstillert/ontstekingsremmer	Novem	1 ml per 40 kg.lg	1-malig	in de spier	28 dgn

Hoe behandel ik mijn zieke geiten?

1. Eerst de juiste diagnose en dan behandelen volgens het bovenstaande plan. Bellen voor overleg mag altijd. Tel: 0511 451 449
2. Bij elke aandoening is het advies om de geit Novem (ontstekingsremmer) bij te geven. De geit zal zich beter voelen en beter (blijven) eten. Let op: dit middel is niet geregistreerd voor geiten. Wachttijd vlees: 28 dagen.
3. Voor hersenvliesontsteking is Peniyet de beste keuze volgens het Formularium. **Let op de hogere dosering bij deze aandoening.**
4. De regelgeving rondom diergeneesmiddelen is aangepast: let op de juiste wachttijd.

Geitenhouder	Dierenarts	Let op: u mag geen antibiotica op voorraad hebben. Overleg bij een ziek dier met uw dierenarts.
Naam:	Naam:	
Datum:	Datum:	
Handtekening:	Handtekening:	

Wormmiddelen groep 2	dosering	werkingsduur	toediening	wachttijd vlees
Leva wormbolus	2 tab/ 30 kg.lg	1-2 dgn	oraal	15 dgn
Wormmiddelen groep 3	dosering	werkingsduur	toediening	wachttijd vlees
Eprinex-Mult pour-on	2 ml/ 10kg.lg	1-2 dgn	op de rug	1 dgn
Dectomax	1 m/ 25 kg.lg	4 wkn	injectie (in de spier)	116 dgn
Cydectin oraal	2 ml / 5 kg.lg	5-6 wkn	oraal	21 dgn
Coccidiose	dosering	werkingsduur	toediening	wachttijd vlees
Tolracol	4 ml / 10 kg.lg	4 wkn	oraal	116 dgn
Maden (myiasis)	dosering	werkingsduur	toediening	wachttijd vlees
Neocidol	1 ml / 1 L water	6 wkn	sprayen 2-4 L / dier	84 dgn
VETo-ZINON	0,85 ml / 2 L water	6 wkn	sprayen 2-3 L / dier	42 dgn
Clik (alleen preventief)	0,6 - 2 ml / kg.lg	16 wkn	op de rug	60 dgn
Ectofly	op gewicht, zie flacon	6-8 wkn	op de rug	12 dgn
Overige aandoeningen	middel	dosering	toediening	wachttijd vlees
Melkziekte	calcitat (off-label)	10-15 ml per dier	onderhuids, 3x daags	1 dgn
Slepemde melkziekte	propyleenglycol	30 ml per dier	oraal 2x daags, 3-4 dgn	1 dgn
	Catosal	5-12ml per dier	onderhuids, 1-malig	1 dgn
Cobalt gebrek bij lammeren	cobalt drench plus	5-10 ml per lam	oraal, 1-malig	1 dgn
	Catosal	3-5 ml per lam	onderhuids, 1-malig	1 dgn

Dierenartsenpraktijk Kollum-Buitenpost stelt zich niet aansprakelijk voor de eventuele veranderingen in de wet, bijsluiters e.d. en de daardoor ontstane fouten in dit behandelplan. De veehouder blijft zelf verantwoordelijk voor het op de juiste manier toedienen van diergeneesmiddelen.

1. Ontworming: na mestonderzoek. Ontworm alleen indien nodig: dit bespaart kosten en voorkomt resistentie.
2. Mestabonnement: vraag bij de praktijk het mestabonnement aan. U betaalt eenmalig abonnementskosten en daarna een klein bedrag per mestmonster. U kunt zo vaak mest laten onderzoeken als nodig is. Het abonnement loopt een kalenderjaar.