

Aandoening	Medicijn	Dosering	Duur in dgn	Hoe/waar	Wachttijd vlees
Baarmoederontsteking	Engemycine	4 ml / 50 kg.lg	max 5 dgn	in de spier	18 dgn
Gewrichtsontsteking	Peniyet	1 ml / 30 kg.lg	3-5 dgn	in de spier	4 dgn
	Engemycine	4 ml / 50 kg.lg	max 5 dgn	in de spier	18 dgn
Hersenvliesontsteking (Listeria)	Peniyet	1 ml / 10 kg.lg !!	3-5 dgn	in de spier	6 dgn
Huidontsteking (navel) of wonden	Peniyet	1 ml / 30 kg.lg	3-5 dgn	in de spier	4 dgn
	CTC-spray	1-2 x daags op de wond aanbrengen			0 dgn
Longontsteking (zomerlongontst.)	Alamycine	1 ml /10 kg.lg	1-malig	in de spier	20 dgn
	Engemycine	4ml / 50kg.lg	3-5 dgn	in de spier	18 dgn
	Peniyet	1 ml / 30 kg.lg	3-5 dgn	in de spier	4 dgn
Ooglidontsteking (conjunctivitis)	Opticlox	1/6 injector	4 x daags	op de oogbol	0 dgn
Rotkreupel	Engemycine	4 ml / 50 kg.lg	max 5 dgn	in de spier	18 dgn
	Alamycine	1 ml /10 kg.lg	1-malig	in de spier	20 dgn
	CTC-spray	1-2 x daags op de wond aanbrengen			0 dgn
Strottenhoofdontsteking	Peniyet	1 ml / 30 kg.lg	3-5 dgn	in de spier	4 dgn
Uierontsteking (mastitis)	Orbenin lactation	1 inj per speen	1-malig	in de uier	7 dgn
	Mamyzin	7-8 ml van de oplossing/dag	3 dgn	in de spier	15 dgn
Verwerpen	Engemycine	4 ml / 50 kg.lg	max 5 dgn	in de spier	18 dgn
Pijnstiller/ontstekingsremmer	Novem	1 ml per 40 kg.lg	1-malig	in de spier	23 dgn

Hoe behandel ik mijn zieke schapen?

1. Eerst de juiste diagnose en dan behandelen volgens het bovenstaande plan. Bellen voor overleg mag altijd. Tel: 0511 451 449
2. Bij elke aandoening is het advies om het schaap Novem (ontstekingsremmer) bij te geven. Het schaap zal zich beter voelen en beter (blijven) eten. Let op: dit middel is niet geregistreerd voor schapen. Wachttijd vlees: 23 dagen.
3. Voor hersenvliesontsteking is Peniyet de beste keuze volgens het Formularium. **Let op de hogere dosering bij deze aandoening.**
4. De regelgeving rondom diergeneesmiddelen is aangepast: let op de juiste wachttijd.

Schapenhouder	Dierenarts	Let op: u mag geen antibiotica op voorraad hebben. Overleg bij een ziek dier met uw dierenarts.
Naam:	Naam:	
Datum:	Datum:	
Handtekening:	Handtekening:	

Wormmiddelen	dosering	werkingsduur	toediening	wachttijd vlees
groep 1				
Panacur boli	1 tab/ 50 kg.lg	1-2 dgn	oraal	21 dgn
Bovex	1 ml/ 4,5 kg.lg	1-2 dgn	oraal	16 dgn
groep 2				
Leva wormbolus	1 tab/ 30 kg.lg	1-2 dgn	oraal	10 dgn
Némisol injectable 250ml (niet overdoseren!!!)	1 ml / 20 kg.lg (max. 2,5ml)	1-2 dgn	injectie (in de spier)	3 dgn
groep 3				
Ivomec	1 ml / 50 kg.lg	3 wkn	injectie (onderhuids)	63 dgn
Eprinex-Mult pour-on	2 ml/ 10kg.lg	1-2 dgn	op de rug	2 dgn
Dectomax	1 ml / 50 kg.lg	4 wkn	injectie (in de spier)	70 dgn
Cydectin oraal	1 ml / 5 kg.lg	5-6 wkn	oraal	14 dgn
groep 4				
Zolvix (alleen bij resistentie)	1 ml/ 10 kg.lg	1-2 dgn	oraal	7 dgn
Leverbotmiddelen	dosering	werkingsduur	toediening	wachttijd vlees
triclabendazolen				
Fasinex: alle leverbotstadia	1 ml 5-10 kg.lg	1-2 dgn	oraal	42 dgn
closantel				
Flukiver combi: alleen volwassen stadia (en mdw)	1 ml / 5 kg.lg	1-2 dgn	oraal	65 dgn
Coccidiose	dosering	werkingsduur	toediening	wachttijd vlees
Tolracol	4 ml / 10 kg.lg	4 wkn	oraal	42 dgn
Maden (myiasis)	dosering	werkingsduur	toediening	wachttijd vlees
Neocidol	1 ml / 1 L water	6 wkn	sprayen 2-4 L / dier	56 dgn
VETo-ZINON	0,85 ml / 2 L water	6 wkn	sprayen 2-3 L / dier	28 dgn
Clik (alleen preventief)	0,6 - 2 ml / kg.lg	16 wkn	op de rug	40 dgn
Ectofly	op gewicht, zie flacon	6-8 wkn	op de rug	8 dgn
Overige aandoeningen	middel	dosering	toediening	wachttijd vlees
Melkziekte	calcitat (off-label)	20 ml per dier	onderhuids, 3x daags	1 dgn
Slepende melkziekte	propyleenglycol	30 ml per dier	oraal 2x daags, 3-4 dgn	0 dgn
	Catosal	5-12ml per dier	onderhuids, 1-malig	1 dgn
Cobalt gebrek bij lammeren	cobalt drench plus	5-10 ml per lam	oraal, 1-malig	0 dgn
	Catosal	3-5 ml per lam	onderhuids, 1-malig	1 dgn

Dierenartsenpraktijk Kollum-Buitenpost stelt zich niet aansprakelijk voor de eventuele veranderingen in de wet, bijsluiters e.d. en de daardoor ontstane fouten in dit behandelplan. De schapenhouder blijft zelf verantwoordelijk voor het op de juiste manier toedienen van diergeneesmiddelen.

1. Ontworming: na mestonderzoek. Ontworm alleen indien nodig: dit bespaart kosten en voorkomt resistentie.
2. Mestabonnement: vraag bij de praktijk het mestabonnement aan. U betaalt eenmalig abonnementskosten en daarna een klein bedrag per mestmonster. U kunt zo vaak mest laten onderzoeken als nodig is. Het abonnement loopt een kalenderjaar.